

Số: 55/NN&PTNT  
V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất  
nông nghiệp

Thanh Hà, ngày 12 tháng 12 năm 2022

Kính gửi:

- UBND các xã, thị trấn;
- Các cơ quan liên quan.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết liên tục rét và khô hanh, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm cao là điều kiện thuận lợi cho cây vải phân hóa mầm hoa, ra hoa, cây vụ đông tạo củ, quả. Qua kiểm tra sản xuất, đến ngày 12/12/2022: các hộ dân đang chuẩn bị gieo mạ trà xuân sớm với những giống lúa dài ngày; tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây vụ đông, thu hoạch diện tích cây vụ đông đến kỳ; cày lật đất diện tích không trồng cây vụ đông tuy nhiên tiến độ rất chậm. Trên cây vải: vải u trứng trắng đang ra hoa, trà vải nhỡ đang phân hóa mầm hoa; trà vải muộn bắt đầu bước vào phân hóa mầm hoa; các hộ dân đã và đang áp dụng biện pháp xử lý lộc đông, tuy nhiên vẫn còn diện tích vải ra lộc đông chưa được xử lý. Trên cây ăn quả khác: cây ổi đang thời điểm thu hoạch chính vụ, sản lượng lớn, chất lượng không cao, giá bình quân 8-10.000đ/kg; cây chuối Tết một số diện tích sớm đang thu hoạch; cây quất trái vụ đang đậu quả non; ...

Theo dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 16-17/12/2022, một đợt không khí lạnh mạnh có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta khiến nền nhiệt giảm sâu, trời rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày từ 13-15 độ), rét hại (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ), ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển cây trồng.

Để đảm bảo cho sản xuất Đông Xuân đạt kế hoạch, cây vải phân hóa mầm hoa, ra hoa thuận lợi. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn tập trung chỉ đạo, khuyến cáo các hộ dân thực hiện một số nội dung sau:

### 1. Đối với lúa Đông xuân

- Chỉ đạo các hộ dân gieo mạ trà xuân sớm theo đúng lịch thời vụ (*gieo từ ngày 15-20/12/2022*). Không gieo mạ vào những ngày nhiệt độ trung bình ngày dưới 15<sup>0</sup>C. Che phủ nilon cho 100% diện tích mạ mới gieo, mạ non khi nhiệt độ xuống thấp để giảm thấp nhất ảnh hưởng của giá rét. Riêng xã Vĩnh Lập, không gieo mạ được giống dài ngày trà muộn để cây trước lịch.

- Chỉ đạo các hộ nông dân đẩy nhanh tiến độ cày lật đất cho toàn bộ diện tích không trồng cây vụ đông để đất được hả hơi, hạn chế nơi trú ngụ của chuột, mầm bệnh và cỏ dại phát triển, đảm bảo toàn bộ diện tích đất cày xong trong tháng 12.

- Chuẩn bị đầy đủ giống lúa để đảm bảo gieo cấy đúng lịch thời vụ; chuẩn bị các nguồn giống lúa dự phòng trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại bất thường xảy ra mà chết phải gieo lại.

- UBND các xã, thị trấn chỉ đạo HTX dịch vụ nông nghiệp, các cửa hàng đại lý cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn căn cứ vào cơ cấu giống để cung ứng giống, phân bón đảm bảo số lượng, chất lượng phục vụ sản xuất kịp thời.

## **2. Đối với cây vụ đông**

- Chỉ đạo các hộ dân chủ động chăm sóc, cung cấp đủ nước tưới và phòng trừ sâu bệnh cho cây vụ đông. Tăng cường áp dụng quy trình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, thực hiện nghiêm quy định an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm rau xanh và chủ động liên kết tìm thị trường tiêu thụ ổn định cho rau màu vụ đông.

- Chủ động thu hoạch diện tích cây vụ đông đã đến kỳ thu hoạch, đồng thời vệ sinh đồng ruộng, cày lật đất diện tích đã thu hoạch xong.

## **3. Đối với cây vải**

- Tập trung chỉ đạo các hộ dân áp dụng quy trình sản xuất vải theo tiêu chuẩn VietGAP vào sản xuất trên toàn bộ diện tích trồng. Đối với các vùng vải đã được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu tiếp tục áp dụng quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, tiêu chuẩn xuất khẩu.

- Đối với diện tích vải U trứng trắng đã ra hoa cần thường xuyên theo dõi vườn cây, trong trường hợp vải vừa hoa vừa lộc cần tiến hành ngắt bỏ lộc tạo điều kiện cho hoa sinh trưởng, phát triển.

- Đối với các cây vải ra lộc đông, tiến hành xử lý lộc đông tạo điều kiện thuận lợi cho cây vải phân hóa mầm hoa, ra hoa bằng các biện pháp:

+ Đối với những cây vải lộc đông đang đỏ, áp dụng các biện pháp xử lý lộc như: bẻ, tuốt lá lộc trên những cây ra lộc theo từng cành, cây có tán thấp; hoặc dùng HPC97, pha 100-150ml thuốc/bình 16-18 lít phun đều trên những cành ra lộc mới nhú dài 1-2cm, nếu trời nắng ấm phun lại lần 2 sau phun lần 1 từ 5-7 ngày.

+ Đối với những cây vải chính vụ đã ra lộc đông, lộc đã xòe lá và chuyển sang màu nâu xanh, tiến hành phun phân bón lá HPC97 (pha theo tỷ lệ 30-50ml

thuốc/bình 16-18 lít) để kích thích lá nhanh thành thực, bước vào phân hóa mầm hoa, ra hoa kịp thời vụ.

- Đồi với diện tích vải chưa có biểu hiện ra lộc cần chủ động theo dõi, xiết nước trên vườn, trong rãnh, không tưới nước, không bón phân, đặc biệt là đạm cho đến khi cây ra hoa.

#### **4. Đồi với cây ăn quả khác**

- Đồi với cây ổi: tập trung thu hoạch diện tích ổi trái vụ đến kỳ, đồng thời tăng cường áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP vào chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cho ổi. Lưu ý: sau thu hoạch các hộ tiến hành thu gom bao bì bọc ổi, vệ sinh vườn trồng sạch sẽ, xử lý quả ổi bị sâu, bệnh hại để tránh tàn dư lây lan.

- Đồi với cây chuối: thu hoạch diện tích chuối đã đến kỳ, đồng thời áp dụng các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, bảo vệ cho diện tích chuối, đặc biệt diện tích chuối phục vụ Tết Nguyên Đán.

- Đồi với cây quất: đảm bảo cung cấp đầy đủ nước cho quất sinh trưởng, phát triển; tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cho quất. Áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP cho các vùng sản xuất quất tập trung.

- Đồi với các loại cây trồng khác: áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất theo từng loại cây trồng để chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại hiệu quả.

Trên đây là một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo trong sản xuất nông nghiệp thời gian gian tới. Đề nghị các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: NN&PTNT.



**Nguyễn Thị Huệ**