

Số: /TB-TTĐVNN

Thanh Hà, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

Tình hình sâu bệnh trên lúa xuân, cây ăn quả và dự báo trong thời gian tới

Kính gửi: 20 xã, thị trấn trong toàn huyện

I. THỜI TIẾT, CÂY TRỒNG

1. Thời tiết: Trong thời gian qua trời có mưa phùn, nồm ẩm, xen kẽ có 1 đợt không khí lạnh trời rét. Nhiệt độ trung bình 16 - 22°C, ẩm độ không khí trung bình 75-85%.

2. Cây trồng:

- Lúa xuân: Cơ bản cây xong, cây lúa đang bén rễ hồi xanh đến đẻ nhánh.

- Trên cây vải: Trà vải sớm đang nở hoa, trà vải nhỡ, vải thiều đang phát triển hoa.

II. DIỄN BIẾN DỊCH BỆNH:

1. Trên lúa xuân:

- Ốc bươu vàng: Gây hại cục bộ một số diện tích lúa chân bãi trũng, mật độ trung bình 0,2con/m², nơi cao 1,0con/m², ốc non đến trưởng thành đẻ trứng. Đa số đã được các hộ nông dân thu bắt và dùng thuốc diệt trừ.

Ngoài ra còn một nước, chuột gây hại cục bộ.

2. Trên cây vải:

- Sâu đục chẻ hoa: Gây hại rải rác trên trà vải thiều chính vụ, mật độ trung bình 0,03con/cành, nơi cao 0,1con/cành, sâu đa số tuổi 2 đến tuổi 4.

- Sâu đo: Gây hại các trà vải, mật độ trung bình 0,08con/cành, nơi cao 0,2con/cành, sâu đa số tuổi 2 đến tuổi 4.

- Sâu cuốn tổ: Gây hại rải rác trên các trà vải, mật độ trung bình 0,06con/cành, nơi cao 0,2con/cành, sâu đa số tuổi 3 đến tuổi 5.

- Bệnh sương mai: Gây hại rải rác trà vải sớm tỷ lệ cành bị nhiễm trung bình 0,5% nơi cao 1,0% cấp bệnh từ cấp 1 đến cấp 3.

Ngoài ra còn nhện lông nhung, rệp sáp vảy, rệp kim gây hại rải rác.

III. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI:

1. Trên lúa chiêm xuân:

- Chuột: di chuyển gây hại các trà lúa.

- Ốc bươu vàng: Ốc tăng mật độ gây hại lúa.

Ngoài ra còn chuột, bọ trĩ, gây hại cục bộ.

2. Trên cây vải:

- Bệnh sương mai: Nếu thời tiết âm u, mưa ẩm, bệnh sẽ phát sinh lây lan gây hại hoa và quả non các trà vải, đặc biệt nếu mưa ẩm kéo dài bệnh sẽ gây cháy hoa trên diện rộng.

- Sâu đo, sâu đục chẻ hoa, sâu cuốn tổ: tăng mật độ gây hại hoa, quả non các trà vải đặc biệt diện tích vải chưa được phun trừ.

Ngoài ra còn dòi, sâu đục quả gây hại quả non trà vải sớm (u trứng), rệp muội, rệp sáp, nhện lông nhung, ...gây hại rải rác.

IV. ĐỀ NGHỊ :

Các xã tổ chức và chỉ đạo tốt chiến dịch diệt chuột theo Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Thanh Hà.

1 - Trên cây lúa:

- Các xã điều tiết nước để các hộ nông dân bước vào bón thúc được thuận lợi với lượng như sau:

Đợt 1: Khi lúa bén rễ hồi xanh: Lượng bón cho 1 sào: 2 - 3kg đạm ure, 1 - 1,5kg kali. Đợt 2: Sau đợt 1: 18 - 20 ngày, lượng bón cho 1 sào 3 - 4kg ure (có thể thay thế đạm urê, kali bằng phân tổng hợp NPK tương ứng).

- Đối với ốc bươu vàng: Bắt ốc trưởng thành và trứng đem tiêu hủy. Nếu mật độ ốc cao ($> 1,5\text{con/m}^2$), dùng các loại thuốc Clodan Super 700WP, VT-DAX 700WP, ... phun hoặc trộn với đất bột rắc đều để tiêu diệt ốc.

2. Trên cây vải:

- Bệnh sương mai:

+ Nếu thời tiết bình thường: Dùng Ricide 72 WP, Antracol 70WP, Dipy 750WP ... phun cho các trà vải khi bệnh chớm xuất hiện.

+ Dùng dung dịch Boocđô 1% phun phòng nếu thời tiết mưa ẩm kéo dài, ẩm độ không khí cao (3 đến 5 ngày phun 1 lần, trước khi phun nên rung cây nhằm tăng hiệu lực của thuốc) hoặc sau trận mưa rào đầu mùa.

- Sâu đo, sâu cuốn tổ: Dùng Pounce 50EC, Peran 50EC, kết hợp với 1 trong các loại thuốc sinh học như Dylan 2EC, Kuraba WP, Rholam Super 50SG ... phun trừ khi phát hiện mật độ sâu 0,25con/cành.

- Sâu đục chẻ hoa trên cây vải: Dùng thuốc Prevathon 5SC, Virtako 40WG, ... phun trừ khi phát hiện mật độ sâu 0,25 con/cành.

- Rệp sáp: những vườn vải nhiễm rệp sáp vầy, rệp kim các hộ nông dân chú ý thu gom những cành lá bị rệp gây hại nặng đem tiêu hủy bằng cách đốt hoặc đào hố chôn vùi (đào hố, cho cành, lá bị hại xuống hố nên rắc một lớp vôi bột lên bề mặt trước khi lấp đất). Sau đó dùng thuốc Glim 270SC, Marshal 200SC hoặc Movento 150OD... phun trừ.

- Đối với rệp muội: Dùng Fastac 5EC, Altach 5EC, ... phun trừ khi thấy mật độ rệp hại 5% số cành.

- Đối với nhện lông nhung: Các hộ kiểm tra trên các trà vải khi phát hiện thấy trên 3% số cành bị nhiễm dùng một trong thuốc: Ortus 5SC, ... phun trừ.

- Đối với dòi, sâu đục quả non (vải sớm): Dùng Prevathon 5SC, Virtako 40WG, ... phun phòng cho trà vải sớm khi vừa hình thành quả non.

(Chú ý: Nên phun trước khi hoa vải nở rộ, không nên phun khi nhiệt độ dưới 15⁰C và luân phiên sử dụng thuốc trong quá trình sử dụng để hạn chế tính kháng thuốc của sâu).

Nơi nhận:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| - VP: Huyện uỷ, VP HĐND- UBND huyện; | } Đề
báo
cáo |
| - Đ/c Chủ tịch, PCT UBND huyện; | |
| - Chi cục TT&BVTV, KN tỉnh | |
| - Như kính gửi; | |
| - Các phòng ban liên quan; | |
| - Các hộ kinh doanh thuốc BVTV | |
| - Lưu. | |

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Thị Thơm

